



GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

18.09.2017

COMUNICAT DE PRESĂ

Ce este cancerul ovarian și cum poate fi tratat?

La persoanele sănătoase, ovarele sunt compuse din celule care se multiplică în conformitate cu cerințele organismului. Celulele care se formează în afara nevoilor sunt anormale, acestea fiind denumite „tumori”. Tumorile pot fi benigne sau maligne.

De exemplu, chisturile ovariene pline cu lichid observate la femeile sub 30 de ani sunt benigne. Acestea fie dispar singure, fie pot fi îndepărtate prin operație dacă este necesar. Tumorile benigne nu invadează țesuturile din jur, dar tumorile pe care le numim maligne invadează atât ovarele, cât și țesuturile înconjurătoare. Cancerul ovarian se poate răspândi în abdomen, la intestine, stomac, și chiar în zonele îndepărtate ale corpului prin căile sanguine și limfatice. O astfel de răspândire este denumită „metastază”.

Există mai multe tipuri de cancer ovarian. Cel mai frecvent este „cancerul ovarian epitelial”, iar celelalte tipuri de cancer ovarian sunt foarte rare. Incidența cancerului ovarian epitelial la femei este de aproape 1 la 55 de femei.

Poate fi cancerul ovarian diagnosticat devreme?

“Cancerul ovarian este un cancer care poate fi tratat atunci când diagnosticul este precoce. Cu toate acestea, deoarece în stadiile incipiente, boala nu provoacă nici un simptom, diagnosticul este pus când boala este avansată. Din acest motiv, se observă că ratele de mortalitate în cazul cancerelor ovariene sunt mai mari decât în cazul tuturor celorlalte forme de cancer ale organelor de reproducere. La o clasificare a bolilor de cancer care provoacă decesul la femei, cancerul ovarian se află pe locul patru”, explică doctorul oncolog Sadi Kerem Okutur de la [Grupul Internațional de Spitale Medical Park din Turcia](#).

Care sunt simptomele?

“S-a menționat dificultatea diagnosticării timpurii. Cancerul poate avansa foarte mult până la apariția primelor simptome. Pacientele pot acuza balonare, senzație de gaze, disconfort în jumătatea inferioară a abdomenului, scăderea poftei





**GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL**

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

de mâncare sau senzația de plenitudine. Indigestia, greața, pierderea în greutate pot atrage atenția. Tumora crescută poate apăsa pe organele vecine provocând nevoia de a urina frecvent. Mai rar, pot apărea sângerări vaginale. Acumularea de lichide în abdomen poate duce la balonare, iar acumularea de lichide în lobi pulmonari poate duce la dificultăți de respirație”, spune doctorul oncolog Sadi Kerem Okutur de la [Medical Park din Turcia](#).

Cum se pune diagnosticul în cazul cancerului ovarian?

Pacienta este consultată de medic după efectuarea anamnezei. Acest consult se efectuează de către un medic „ginecolog-obstetrician”. În plus se examinează ovarele prin ecografie, iar suplimentar se verifică prezența în sânge a markerului CA-125, care are relevanță majoră în diagnosticul cancerului ovarian. Totuși, acest marker poate crește și în cazul unor boli benigne ale ovarului.

“Diagnosticul de cancer se pune în urma examinării de către un „patolog” a unei mostre de țesut prelevată prin „biopsie” din ovar sau, în cazul pacienților cu lichid acumulat în abdomen, a mostrei de lichid. Intervenția chirurgicală pentru prelevarea biopsiei din zonele suspecte prin deschiderea abdomenului se numește „laparotomie”. Mostre prelevată se examinează de către patolog în timpul operației. Dacă această mostră primește diagnosticul de „cancer”, se continuă operația. În timpul operației, în funcție de decizia chirurgului se îndepărtează uterul, trompele uterine, ovarele, peritoneul. În plus, se prelevează mostre din diafragmă, celelalte organe, ganglionii limfatici din vecinătate și lichidul abdominal pentru a se finaliza „stadializarea chirurgicală”, toate aceste mostre fiind examinate de către patolog. Este foarte importantă determinarea gradului de răspândire a bolii în organism în tratament și monitorizare”, declară doctorul Sadi Kerem Okutur.

Cum se tratează cancerul ovarian?

Gradul de răspândire a bolii în organism, vârsta și starea generală a pacientului influențează modul în care este tratată. Tratamentul clasic al cancerului este intervenția chirurgicală și ulterior chimioterapia. În unele cazuri, pentru a răspunde plângerilor pacientului, se aplică de asemenea radioterapia (terapia cu fascicul).

“În cazul abordării chirurgicale, se poate face fie operația de „histerectomie”, fie o operație denumită „salpingo-ooforectomie bilaterală”, în care o dată cu uterul se îndepărtează și cele două ovare sau, în cazurile în care operația necesară nu se poate face pentru că boala este foarte răspândită, se face intervenția denumită „debulking”, pentru îndepărtarea unei părți cât mai mari din țesutul tumoral. Dacă s-a putut pune diagnosticul înainte de laparotomie și tumora nu poate fi îndepărtată complet chirurgical, înainte de intervenție se aplică un tratament medicamentos





**GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL**

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

pentru reducerea tumorii și abia după aceea ce procedează la intervenția chirurgicală. În cazuri rare, dacă boala a cuprins un singur ovar, iar pacienta este la o vârstă tânără și dorește să nască, se îndepărtează numai ovarul afectat”, continuă doctorul de la Medical Park.

După operație, administrarea medicamentelor anti-cancerigene este denumită chimioterapie. Această terapie poate fi aplicată prin administrarea medicamentelor pe cale orală, intravenoasă sau intra-abdominală, prin perfuzie cu ser și medicament. Chimioterapia se efectuează în general în ambulatoriu. Nu este necesară internarea în spital. Există anumite medicamente de susținere pentru eliminare senzației de greață și a vărsăturilor ce apar în funcție de medicamentele administrate prin chimioterapie. Efectele adverse ale chimioterapiei asupra celulelor sanguine și a organelor se monitorizează prin analize de sânge efectuate regulat.

Cum se face monitorizarea după tratament?

După tratament, timp de doi ani, pacienții vin la control fizic o dată la trei luni, ocazie cu care se determină și markerul CA-125 iar în caz de nevoie se fac radiografiile pulmonare și tomografiile abdominale. În următorii trei ani aceste controale se fac o dată la șase luni, iar apoi anual.

Relația dintre cancerul de col uterin și genetică

“În urma studiilor efectuate, s-a demonstrat existența factorilor ereditari în cazul a 10% din toate cazurile de cancer. Cercetările genetice efectuate cu privire la cancerele frecvent întâlnite au constatat existența unor modificări genetice dobândite în timpul vieții în cazul unor pacienți. Aceste modificări din zona genetică denumite oncogene apar în celulele somatice și nu se moștenesc de către alte persoane din familie. Cu toate acestea, persoanele la care se observă astfel de modificări dezvoltă diverse forme de cancer. În zilele noastre, s-a constatat că în 10% din cazurile de cancer la sân, ovare, colon sau col uterin sunt cauzate de mutații generice cunoscute”, conchide doctorul oncolog Sadi Kerem Okutur de la [Grupul Internațional de Spitale Medical Park din Turcia](#).

Grupul Internațional de Spitale Medical Park din Turcia s-a lansat în anul 1995, iar la ora actuală acesta deservește pacienți în peste 30 de spitale situate în 17 orașe din Turcia. În momentul de față este actorul principal al sectorului medical, fiind tratați peste 70.000 pacienți din întreaga lume. Indiferent de statul social și economic, serviciile de acces la asistență medicală la standarde internaționale sunt bazate de principiul „sănătate pentru toți”. Medical Park monitorizează îndeaproape tehnologii de înaltă clasă și metode terapeutice la nivel mondial. De asemenea, își propune să servească drept model în știință și practici inovatoare. Grupul continuă





**GRUPULUI INTERNATIONAL
MEDICAL PARK INTERNATIONAL**

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Adresa: Bahçelievler Mahallesi, E-5 Karayolu / Kültür
Sok No:1, 34180 Bahçelievler/İstanbul, Turcia

Telefon: +905306838950

adăugarea de noi membri, în conformitate cu principiul „este dreptul fiecărui popor de a trăi sănătos și să aibă acces la serviciile de sănătate”. Din anul 2016, România face parte din Grupul Internațional Medical Park.

Persoană de contact

Doina SIRIKCI

Director România și Republica Moldova
al Grupului International Medical Park din Turcia

Telefon: +905306838950

www.medicalparkromania.com

office@medicalparkromania.com

Transmite,

Dr. Tănase Tasețe

Director General

Plus Communication

0725.465.508

